

KLEINGÄRTNERVEREIN NORDEND e.V.

Fachberater Walter Lachenmayer (Anlage III, 407)

Ausgabe 4 2016



Hallo Gartenfreunde/innen!

Der Austrieb an den Obstbäumen hat begonnen.

Die Blättchen sind zusehend, je nach Früh- oder Spätsorten im Mausohrstadium.

Dann ist der richtige Zeitpunkt zur Austriebsspritzung gegen Schädlinge. Die im Handel zu erhaltenden paraffinöhlhaltigen Mittel wirken gegen Spinnmilben und Schildläuse. Unter dem Ölfilm ersticken Frostspanner- und Blattläuseier. Apfel- und Pflaumenwickler-Kirschfruchtfliege-Gespinstmotten werden von diesen Mitteln nicht erfasst.

Gegen Apfelschorf empfiehlt sich eine Beimischung von Mitteln die gegen Pilzbildung hilfreich sind. (z.B. Universal-Pilzfrei Baycor M)

Spitzendürre-Monilia an Sauerkirschen kann bei feuchtem Wetter sehr schnell Verbreitung finden. Dies erfordert 2 - 3 Spritzungen mit einem Spritzmittel gegen Pilzsporen. (z.B. Obst-Pilzfrei Teldor oder gleichwertiges Mittel). Bitte direkt in die Blüten spritzen. Ist die Spitzendürre bereits ausgebrochen, dann die durren Zweige bis ins gesunde Holz zurückschneiden.



Es grüßt Sie
Ihr Fachberater
Walter Lachenmayer (407)