

KLEINGÄRTNERVEREIN NORDEND e.V.

Fachberater Walter Lachenmayer (Anlage III, 407)

Ausgabe 11 2014



Hallo Gartenfreunde/innen !

mit den ersten Nachtfrosten ist zu rechnen.

Dies ist die Zeit in der „Frostspanner“ an den Obstbäumen aktiv werden. Der Schädling ist im Frühjahr der erste, der die jungen Blätter des Austriebs anfrisst und schädigt.

Die Weibchen können nicht fliegen. Nachdem sie sich im Boden verpuppt haben, kriechen sie die Baumstämme hinauf, um an jungen Trieben ihre Eier abzulegen. Auf dem Weg in die Baumkronen kann man sie mit Hilfe von Leimringen abfangen, bevor sie ihre Eier ablegen können. Leimringe sind im Fachhandel erhältlich.



Aber auch selbstgebastelte Streifen aus Plastiktüten erfüllen ihren Zweck. Diese müssen nur mit Leim bestrichen werden. (als Ersatzleim ebenfalls erhältlich). Leimringe müssen festen Sitz haben, es sollten keine Schlupfwege unter dem Ring vorhanden sein. Prüfen Sie die Leimstreifen regelmäßig ob vom Wind angeklebte Laubteile Brücken für die Frostspanner-Weibchen darstellen. (ggf. auch neuen Leim auftragen)

Der Winterbaumschnitt kann ebenfalls dazu beitragen, dass bereits abgelegte Eier des Frostspanners mit den Zweigen entfernt werden.

Es grüsst sie Ihr Fachberater