

# KLEINGÄRTNERVEREIN NORDEND e.V.

Fachberater Walter Lachenmayer (Anlage III, 407)



Ausgabe 11 2016

Hallo Gartenfreunde/innen!

An Brombeeren breitet sich leider die **Brombeermilbe** aus. Dornenlose Sorten sind mehr befallen als Brombeeren mit Dornen.

An den Blätterunterseiten finden Sie helle gelbe Punkte.

Die Frucht reift nicht mehr aus, die Brombeeren bleiben ganz oder teilweise rot und bleiben sauer.

Eine Bekämpfung ist in diesem Stadium nicht mehr möglich.



Ein **starker Rückschnitt** der Neutriebe ist vorbeugend für das nächste Jahr ratsam. Die alten Ruten werden ganz unten am Boden abgeschnitten und entsorgt. (Nicht kompostieren).

Auch die **Fruchtfäule an Äpfeln und Birnen** ist stark zu beobachten. Die Pilzsporen (Monilia) dringen in die kleinsten Wunden der Frucht ein und verursachen den Befall.

Die Witterung begünstigt auch den Befall an **Pflaume, Zwetsche und Mirabelle**. Das Mittel Obst-Pilzfrei Teldor oder ähnliche Produkte sind zur Spritzung zugelassen. (Wartezeit bis zur Ernte 3 Tage)

Es grüßt Sie  
Ihr Fachberater  
Walter Lachenmayer (407)